

Prospect: informații pentru utilizator**SINECOD 7,5 mg/5 ml sirop**
dihidrogenocitrat de butamirat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct.4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Sinecod și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Sinecod
3. Cum să utilizați Sinecod
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Sinecod
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Sinecod și pentru ce se utilizează

Sinecod conține ca substanță activă dihidrogenocitrat de butamirat, ce aparține unui grup de medicamente numite antitusive.

Sinecod este utilizat pentru tratamentul simptomatic al tusei provocate de diferite cauze.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Sinecod**Nu utilizați Sinecod**

- dacă sunteți alergic la dihidrogenocitratul de butamirat sau la oricare dintre celelalte substanțe din compoziția medicamentului (vezi pct. 6 și pct. 2)
- dacă suferiți de insuficiență respiratorie severă.

Atenționări și precauții

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă tusea persistă mai mult de 7 zile.

Sinecod împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să evitați utilizarea simultană a altor medicamente împotriva tusei, deoarece poate duce la stagnarea mucusului în plămâni.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați utilizați Sinecod doar la recomandarea medicului dumneavoastră.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În cazuri rare, Sinecod poate cauza o diminuare a stării de vigilență. Dacă sunteți într-o astfel de situație trebuie să manifestați prudență atunci când conduceți vehicule sau folosiți utilaje. Copilul dumneavoastră trebuie să evite mersul în trafic pe bicicletă sau scuter după ce a utilizat Sinecod.

Sinecod conține sorbitol

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că, copilul dumneavoastră are intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Sinecod conține etanol

Acest medicament conține cantități mici de etanol (alcool), mai puțin de 100 mg pe doză.

3. Cum să utilizați Sinecod

Nu utilizați Sinecod mai mult de 7 zile fără recomandarea medicului dumneavoastră.

Copii între 3 și 6 ani: 5 ml de 3 ori pe zi.

Copii între 6 și 12 ani: 10 ml de 3 ori pe zi.

Copii peste 12 ani (adolescenți): 15 ml de 3 ori pe zi.

Adulți: 15 ml de 4 ori pe zi.

Spălați și uscați capacul gradat după fiecare utilizare și atunci când este folosit de mai multe persoane.

Dacă luați mai mult Sinecod decât trebuie

Dacă luați prea mult din acest medicament, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să luați Sinecod

Dacă ați uitat să administrați o doză de Sinecod, administrați-o când vă aduceți aminte. Dacă este totuși timpul pentru următoarea doză, administrați-o direct pe aceasta. Nu administrați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacții adverse pot să apară în cazuri rare (pot afecta până la 1 din 1000 utilizatori): Somnolență, erupții cutanate, greață și diaree.

Aceste reacții adverse ar trebui să dispară dacă se reduce doza sau se întrerupe administrarea medicamentului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Sinecod

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

A nu se utiliza Sinecod după data de expirare înscrisă pe cutie și flacon, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu turnați niciodată siropul din măsura dozatoare, înapoi în flacon.

Aruncați sticla goală și măsura dozatoare cu grijă în containere de reciclare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Sinecod

- Substanța activă este dihidrogenocitratul de butamirat. Un mililitru de Sinecod conține 1,5 mg dihidrogenocitrat de butamirat.

- Celelalte componente (excipienți) sunt: sorbitol soluție 70% (E420), glicerol, zaharină sodică, acid benzoic (E210), vanilină, etanol 96%, hidroxid de sodiu 30%, apă purificată.

Cum arată Sinecod și conținutul ambalajului

Sinecod este un lichid clar, incolor sau slab-gălbui, cu gust dulce și ușor amăru. Este furnizat într-un flacon din sticlă brună închis cu un capac cu protecție pentru utilizarea de către copii.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricanții

Deținătorul autorizației de punere pe piață

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.

Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One

Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România

Fabricanții

NOVARTIS CONSUMER HEALTH GmbH

Zielstattstrasse 40, 81379 München, Germania

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GmbH & Co. KG

Barthstraße 4, 80339 München, Germania

Acest prospect a fost aprobat în iulie 2017.