

SARGENOR, soluție orală, 1 g/5 ml
Aspartat de arginină**Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați medicamentul SARGENOR cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dumneavoastră dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după o lună de tratament.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este medicamentul SARGENOR și pentru ce se utilizează
2. Înainte de a utiliza medicamentul SARGENOR
3. Cum se utilizează medicamentul SARGENOR
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează medicamentul SARGENOR

SARGENOR, soluție orală, 1 g/5 ml

Substanța activă este aspartatul de arginină.

5 ml soluție orală conțin aspartat de arginină 1 g.

Celelalte componente sunt: zahăr, aromă de caise (vanilină, aldehidă benzoică, acetat de amidon, diacetil-ioniță, caproat de alil, gamma undelactonă, gamma nonlactonă, tinctură de levisticum, uleiuri esențiale de lămâie, portocale, bergamot, coriandru, neroli, mușețel, scorțișoară, nucșoară, etanol, apă purificată), aromă de caramel (E 150), p-hidroxibenzoat de metil, p-hidroxibenzoat de propil, apă purificată.

Deținătorul Autorizației de punere pe piață

MEDA PHARMA

40-44 rue Washington 75008, Paris, Franța

Producător

MEDA MANUFACTURING

Avenue J.F. Kennedy - B.P.100

33701 Mérignac CEDEX, Franța

1. CE ESTE MEDICAMENTUL SARGENOR ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ ?

SARGENOR aparține unui grup de medicamente utilizate pentru terapia ficatului, lipotrope.

SARGENOR este disponibil în cutii cu 10, 20 și 40 fiole din sticlă brună, autocasabilă în două puncte, a câte 5 ml soluție orală.

SARGENOR este indicat în tratamentul stărilor de oboseală funcțională la adulți și copii cu vârsta peste 12 ani.

2. ÎNAINTE DE A UTILIZA MEDICAMENTUL SARGENOR

Nu utilizați medicamentul SARGENOR dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre componentele medicamentului.

Acordați atenție utilizării medicamentului SARGENOR (Atenționări și precauții speciale)

Dacă simptomele persistă sau se agravează după mai mult de 1 lună de tratament spuneți medicului dumneavoastră deoarece diagnosticul etiologic și tratamentul trebuie reevaluate.

Tratamentul asteniei la copiii cu vârsta sub 12 ani necesită avizul unui medic specialist.

Deoarece SARGENOR are un efect ușor stimulant, nu este de preferat să luați acest medicament seara sau înainte de culcare.

Utilizarea altor medicamente

Nu sunt disponibile date privind interacțiunile SARGENOR cu alte medicamente.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu se cunosc.

Informații importante privind unii excipienți conținuți de medicamentul SARGENOR

Deoarece SARGENOR conține zahăr, trebuie să țineți cont de acest lucru dacă vi s-a recomandat un regim hipoglucidic sau dacă aveți diabet zaharat (o fiolă conține 1 g zahăr).

3. CUM SE UTILIZEAZĂ MEDICAMENTUL SARGENOR

Luați întotdeauna SARGENOR exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

SARGENOR este un medicament destinat adulților și copiilor cu vârsta peste 12 ani.

Doza uzuală este de o fiolă SARGENOR dimineața și una la prânz sau două fiole SARGENOR dimineața sau la prânz, într-o singură priză.

Nu depășiți doza de trei fiole SARGENOR pe zi.

Pentru administrare diluați conținutul unei fiole de SARGENOR într-un pahar cu apă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Nu se cunosc.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ MEDICAMENTUL SARGENOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați SARGENOR după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data ultimei verificări a prospectului

Ianuarie, 2017